



XPOVIO®
(selinexor)

Cuando se sienta en
una encrucijada por el
mieloma múltiple,

ELIJA UN CAMINO ÚNICO

XPOVIO es un medicamento que se toma por vía oral en el hogar tan solo una vez a la semana y que trata el mieloma múltiple de una forma única, ya en su primera recidiva. El uso de un medicamento que funciona de manera diferente puede ser un enfoque eficaz en lugar de seguir el mismo camino otra vez después de una recidiva.

INDICACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es XPOVIO?

XPOVIO® (selinexor) es un medicamento con receta que se utiliza de la siguiente forma:

- En combinación con bortezomib y dexametasona para tratar a pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos una terapia previa.

Se desconoce si XPOVIO es seguro y eficaz en menores de 18 años.

Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre antes de que empiece a tomar XPOVIO y con frecuencia durante los primeros 3 meses de tratamiento y luego según sea necesario durante el tratamiento.

XPOVIO puede causar efectos secundarios graves, incluidos:


- **Bajos recuentos de plaquetas.** Los bajos recuentos de plaquetas son frecuentes con XPOVIO y pueden ocasionar sangrado, que puede ser grave y, a veces, puede provocar la muerte. Su proveedor de atención médica puede recetarle transfusiones de plaquetas u otros tratamientos para el bajo recuento de plaquetas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún sangrado o le aparecen fácilmente moretones durante el tratamiento con XPOVIO.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

MIELOMA MÚLTIPLE Y RECIDIVA

Aunque su tratamiento pueda funcionar bien al principio, podría dejar de funcionar con el tiempo. Esto puede ocurrir porque sus células de mieloma múltiple se vuelven resistentes al tratamiento que está recibiendo y luego empiezan a multiplicarse de nuevo. Cuando esto sucede y su enfermedad vuelve a estar activa, se llama recidiva. Los síntomas pueden reaparecer cuando esto ocurre.



Es muy frecuente que los adultos con mieloma múltiple experimenten recidivas varias veces a lo largo de su tratamiento. Así que no se desanime, no está solo.

¿Cuál es el siguiente paso después de la recidiva?

La recidiva puede producirse cuando el mieloma múltiple se vuelve resistente a su tratamiento o cuando este ya no es eficaz. El tratamiento de su enfermedad con un medicamento que funciona de forma distinta a los medicamentos que ha usado anteriormente puede ser una opción eficaz para ayudar a combatir una recidiva del mieloma múltiple.



¿LO SABÍA?

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), una organización líder en los lineamientos de la práctica clínica oncológica, recomienda tratar el mieloma múltiple con diferentes medicamentos que funcionen de forma distinta después de una recidiva.*

* Citado con permiso de la Guía de prácticas oncológicas de la NCCN (NCCN Guidelines®) para el mieloma múltiple V.3.2023. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2023. Todos los derechos reservados. Consultado el 15 de mayo de 2023. Para ver la versión más reciente y completa de la guía, visite [NCCN.org](https://www.nccn.org) en línea. La NCCN no otorga ningún tipo de garantías con respecto a su contenido, uso o aplicación, y se exime de cualquier responsabilidad por su aplicación o uso de cualquier forma.

¿Qué es XPOVIO?

XPOVIO se usa junto con VELCADE® (bortezomib) y dexametasona para tratar a adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos una terapia previa.

XPOVIO también se utiliza junto con dexametasona para tratar a adultos cuyo mieloma múltiple ha reaparecido (recidivante) o que no respondió al tratamiento previo (refractario), adultos que han recibido al menos 4 terapias previas y cuya enfermedad no respondió a al menos dos medicamentos inhibidores del proteasoma, al menos dos agentes inmunomoduladores y un medicamento de anticuerpos monoclonales anti-CD38.



Cómo funciona XPOVIO

XPOVIO es un medicamento que se toma por vía oral en el hogar tan solo una vez a la semana, que trata el mieloma múltiple de una forma única y que puede ser un enfoque de tratamiento efectivo ya en su primera recidiva.

XPOVIO funciona de forma diferente a otros tratamientos para el mieloma múltiple para ayudar a restaurar los mecanismos de defensa contra el cáncer de su propio cuerpo.



No está aprobado para tratar a niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Bajos recuentos de glóbulos blancos.** Los bajos recuentos de glóbulos blancos son frecuentes con XPOVIO y, a veces, pueden ser graves. Puede tener mayor riesgo de contraer infecciones bacterianas durante el tratamiento con XPOVIO. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede recetarle antibióticos si tiene signos o síntomas de infección.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.



No está aprobado para tratar a niños.



¿Para quién es XPOVIO?

XPOVIO es para adultos con mieloma múltiple después de haber sufrido una recidiva o de haberse vuelto resistentes a al menos otro tratamiento frecuente, como DARZALEX® (daratumumab).



¿LO SABÍA?

El ensayo clínico que estudió XPOVIO junto con VELCADE y dexametasona incluyó a adultos con diversas características médicas:

- 56%** tenía 65 años o más
- 50%** tenía mutaciones genéticas de alto riesgo como: del(17p), t(4;14), t(14;16), amplificación de 1q21
- 27%** tenía la función renal reducida



¿Cuándo es el momento de considerar XPOVIO?

XPOVIO puede ser adecuado para usted ya en su primera recidiva.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Infecciones graves.** Las infecciones son frecuentes con XPOVIO, pueden ser graves y, a veces, pueden provocar la muerte. Esto incluye infecciones de las vías respiratorias altas o bajas, como la neumonía, y una infección de todo el cuerpo (septicemia). **Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún signo o síntoma de infección, como tos, escalofríos o fiebre, durante el tratamiento con XPOVIO.**

Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

¿Por qué considerar XPOVIO?



Funciona de forma diferente a otros tratamientos para el mieloma múltiple

XPOVIO funciona de una manera única. El uso de un medicamento que funciona de manera diferente puede ser un enfoque eficaz en lugar de seguir el mismo camino otra vez después de una recidiva.



Los adultos ayudados viven significativamente más tiempo sin que su enfermedad empeore

El ensayo clínico estudió a 402 adultos con mieloma múltiple recidivante que habían recibido de 1 a 3 tratamientos previos: 195 pacientes recibieron XPOVIO en combinación con VELCADE y dexametasona, y 207 pacientes recibieron VELCADE y dexametasona sin XPOVIO. El ensayo comparó cuánto tiempo vivían los pacientes sin que su enfermedad empeorara.



Se toma en el hogar

XPOVIO es un medicamento que se toma por vía oral en el hogar tan solo una vez por semana y se toma junto con otros medicamentos según su régimen de tratamiento.



Está fácilmente disponible

XPOVIO está fácilmente disponible para su pedido, y la mayoría de los adultos reciben tratamiento en menos de 1 semana de la prescripción en su farmacia especializada o consulta médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Efectos secundarios neurológicos.** XPOVIO puede causar mareos, desmayos, disminución del estado de alerta y cambios en su estado mental, incluidos problemas para pensar, ver u oír cosas que no están realmente ahí (alucinaciones). Estos problemas a veces pueden ser graves y potencialmente mortales. **Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas. No conduzca ni maneje maquinaria pesada o peligrosa hasta que sepa cómo le afecta XPOVIO. Tome precauciones para evitar una caída.**



XPOVIO se estudió junto con VELCADE y dexametasona, una combinación llamada XVd, o el régimen de tratamiento con XPOVIO, en adultos con mieloma múltiple.

- El estudio se compuso de 402 adultos que habían sufrido una recidiva y habían recibido de 1 a 3 tratamientos previos.
- 195 pacientes recibieron el régimen de tratamiento con XPOVIO y 207 pacientes recibieron el régimen de tratamiento sin XPOVIO.
- El ensayo comparó cuánto tiempo vivían los pacientes sin que su enfermedad empeorara.

Los adultos vivieron significativamente más tiempo sin que su enfermedad empeorara

**LA MITAD DE
LOS ADULTOS VIVIÓ**



**MESES
SIN PROGRESO
O MÁS**

La mitad de los adultos que recibieron el régimen de tratamiento con XPOVIO vivieron durante 13.9 meses o más sin que su enfermedad empeorara en comparación con 9.5 meses para aquellos que recibieron el régimen de tratamiento sin XPOVIO (con una mediana de seguimiento de 15.1 meses).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Náuseas y vómitos y/o diarrea.** Pueden producirse náuseas y vómitos o diarrea cuando toma XPOVIO y a veces pueden ser graves. Podría estar en riesgo de deshidratarse. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos contra las náuseas o la diarrea.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Los adultos experimentaron una respuesta más duradera al tratamiento

**ENTRE LOS ADULTOS QUE RESPONDIERON,
LA MITAD RESPONDIÓ POR**


**20.3 MESES
O MÁS**



Entre los adultos que respondieron, la mitad respondió por 20.3 meses o más después de recibir el régimen de tratamiento con XPOVIO en comparación con 12.9 meses para aquellos que recibieron el régimen de tratamiento sin XPOVIO.*

* No se puede determinar si los resultados se debieron a XPOVIO.

La mayoría de los adultos experimentaron un beneficio

 **3 de 4 ADULTOS
EXPERIMENTARON
RESULTADOS**

El 76% de los adultos que recibieron el régimen de tratamiento con XPOVIO experimentaron al menos un beneficio parcial de la terapia en comparación con el 62% de los adultos que recibieron el régimen de tratamiento sin XPOVIO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Pérdida de apetito y pérdida de peso.** La pérdida del apetito y la pérdida de peso son frecuentes con XPOVIO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una disminución o pérdida del apetito y si está perdiendo peso.



Los adultos tuvieron menos visitas al consultorio médico para recibir su régimen de tratamiento

37% MENOS VISITAS AL CONSULTORIO PARA RECIBIR SU TRATAMIENTO



Los adultos que recibieron el régimen de tratamiento con XPOVIO tuvieron un 37% menos de visitas al consultorio médico en los primeros ~6 meses para recibir el tratamiento en comparación con los que recibieron el régimen de tratamiento sin XPOVIO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Disminución de los niveles de sodio en la sangre.** La disminución de los niveles de sodio en sangre es frecuente con XPOVIO. Su proveedor de atención médica puede hablar con usted acerca de su dieta y recetarle líquidos intravenosos o comprimidos de sal.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

XPOVIO se estudió en adultos con mieloma múltiple en un ensayo clínico anterior

XPOVIO se estudió junto con dexametasona, una combinación llamada Xd.

- El estudio estaba compuesto por 122 adultos con mieloma múltiple que habían recibido al menos 3 o más tratamientos previos.


¿Cómo respondieron los adultos a Xd?



1 de cada 4 adultos
respondió al tratamiento



4 semanas
de mediana de tiempo hasta la
primera respuesta
(rango de 1 a 10 semanas)



3.8 meses
de mediana de la
duración de la respuesta

Los adultos respondieron a Xd rápidamente, con una mediana de tiempo de 4 semanas (el rango fue de 1 a 10 semanas).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- **Aparición o empeoramiento de cataratas, visión borrosa o pérdida de transparencia en el cristalino del ojo.** Las cataratas nuevas o que empeoran son frecuentes con XPOVIO. Si se forma una catarata, su visión puede disminuir y es posible que necesite cirugía ocular para eliminar la catarata y restaurar su visión. **Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de cataratas como visión doble, visión borrosa o sensibilidad a la luz o a los destellos.**



Administración de dosis de XPOVIO



XPOVIO es un medicamento que se toma por vía oral en el hogar tan solo una vez por semana y se toma junto con otros medicamentos según su régimen de tratamiento.

Respuesta al tratamiento



En el ensayo clínico que estudió XPOVIO junto con VELCADE y dexametasona, 3 de cada 4 adultos respondieron al régimen de tratamiento con XPOVIO. De los 3 de cada 4 adultos que respondieron:

1

La mitad de estos adultos obtuvieron beneficios en un plazo de 6 semanas o menos.

2

La mitad siguió viendo un beneficio durante un año y medio o más.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Los efectos secundarios frecuentes de XPOVIO incluyen:

- Cansancio.
- Debilidad.
- Bajo recuento de glóbulos rojos (anemia). Los síntomas pueden incluir cansancio y dificultad para respirar.
- Estreñimiento.
- Dificultad para respirar.
- Aumento del azúcar en sangre.
- Cambios en las sales corporales y los niveles de minerales en la sangre.
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática y renal.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XPOVIO.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Efectos secundarios bien entendidos



No es poco frecuente experimentar algunos efectos secundarios cuando comienza a tomar XPOVIO. **Los posibles efectos secundarios de XPOVIO están bien estudiados y no se ha demostrado que tengan efectos importantes en órganos como el corazón, los pulmones, los riñones o el hígado.**

Si experimenta alguno de estos efectos secundarios graves, debe ponerse en contacto con su médico de inmediato:

- Bajos recuentos de plaquetas.
- Bajos recuentos de glóbulos blancos.
- Náuseas y vómitos.
- Diarrea.
- Pérdida de apetito y pérdida de peso.
- Disminución de los niveles de sodio en la sangre.
- Infecciones graves.
- Efectos secundarios neurológicos.
- Aparición o empeoramiento de cataratas (una opacidad o pérdida de transparencia en el cristalino del ojo).

Algunos efectos secundarios son frecuentes, incluidos los siguientes:

- Cansancio.
- Bajo recuento de glóbulos rojos (anemia).
- Estreñimiento.
- Dificultad para respirar.
- Aumento del azúcar en sangre.
- Cambios en las sales corporales y los niveles de minerales en la sangre.
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática y renal.



Consejo: Es importante que se comunique abierta y proactivamente con su equipo de atención médica si experimenta algún efecto secundario. Cuanto más sepa su equipo de atención médica sobre cómo está respondiendo al tratamiento, más podrá hacer para optimizar su experiencia con el tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar XPOVIO, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, lo que incluye si le ocurre algo de lo siguiente:

- Tiene o ha tenido una infección reciente o activa.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. XPOVIO puede causarle daño al bebé en gestación.
- Está tomando medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas o suplementos a base de hierbas.

Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.




Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Ajuste de la dosis



Su médico le recetará una dosis inicial de XPOVIO. Esta dosis puede ajustarse varias veces con el objetivo de tratar los efectos secundarios para que usted siga con el tratamiento durante más tiempo sin que la eficacia se vea comprometida.

En un ensayo clínico, se observó que el régimen de tratamiento con XPOVIO era eficaz en adultos a quienes se les ajustó la dosis.



Consejo: Pregunte a algún miembro de su equipo de atención médica cómo puede ajustar su dosis con el tiempo para tratar los efectos secundarios y optimizar su experiencia de tratamiento.

Manejo de las náuseas



Su equipo de atención médica le recetará medicamentos contra las náuseas para que los tome antes de que empiece el tratamiento y durante el tratamiento con XPOVIO. Tome siempre su medicamento contra las náuseas según lo prescrito, incluso si no tiene náuseas, ya que tomarlo de manera proactiva podría evitar que se produzcan náuseas en primer lugar. **En un ensayo clínico, en 9 de cada 10 adultos que experimentaron náuseas durante el primer mes de recibir el régimen de tratamiento con XPOVIO, los síntomas mejoraron o desaparecieron por completo.**



Consejo: Pregunte a un miembro de su equipo de atención médica sobre la posibilidad de tomar medicamentos contra las náuseas cuando empiece el tratamiento para ayudar a tratar los posibles efectos secundarios.



Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Antes de empezar

Pregunte a su médico:

- ¿Qué medicamentos tomaré además del régimen de tratamiento con XPOVIO, como los medicamentos proactivos para las náuseas?
- ¿Debería cambiar mi dieta durante el tratamiento? ¿Cuántos alimentos debo comer? ¿Qué cambios en la dieta debo notificar?
- ¿Qué tipos de líquidos debo beber y cuánto por día?
- ¿Qué tipo de recetas, medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas puedo seguir tomando durante el tratamiento?
- ¿Qué efectos secundarios podría experimentar?
- ¿Cómo y cuándo debo comunicar cualquier efecto secundario a mi equipo de atención médica?
- ¿Cómo me apoyará mi equipo de atención médica a seguir con el tratamiento si experimento efectos secundarios desde el inicio?

Cómo tomar XPOVIO

- No rompa, mastique, triture ni divida los comprimidos de XPOVIO. Tome XPOVIO con agua.
- Tome cualquier medicamento que le recete su equipo de atención médica contra las náuseas o los vómitos antes de que comience el tratamiento y durante el tratamiento con XPOVIO. Esto puede mejorar su experiencia con XPOVIO.
- No cambie su dosis ni deje de tomar XPOVIO sin hablar primero con un miembro de su equipo de atención médica.
- Si omite una dosis de XPOVIO, simplemente tome la siguiente dosis en el siguiente día y horario regular programado. No duplique la dosis.
- Si vomita después de tomar una dosis de XPOVIO, no tome una dosis adicional. Deseche cualquier comprimido de XPOVIO residual visible en el vómito y tome la dosis en el siguiente día y horario regular programado.
- Si toma XPOVIO de más, comuníquese con un miembro de su equipo de atención médica de inmediato.
- Nunca comparta su receta con otras personas.



El Programa de apoyo al paciente de KaryForward está aquí para brindarle apoyo en cada paso del camino.



Asistencia financiera*

- Recibir asistencia con el coste de su medicamento.
- Si es elegible:
 - Pagar tan solo 5 USD por cada receta, O BIEN
 - Recibir su medicamento sin coste alguno para usted.
- Si no cumple los requisitos de elegibilidad, recibir asistencia para buscar fuentes alternativas de cobertura.



Cobertura del seguro*

- Comprender los beneficios y la cobertura de su seguro.
- Recibir apoyo con las reclamaciones y las apelaciones del seguro.
- Acceder al tratamiento si se producen retrasos o interrupciones inesperados en la cobertura.



Apoyo†

- Recibir apoyo individual personalizado de personal de enfermería licenciado con experiencia en la educación de los pacientes, incluido lo siguiente:
 - Materiales educativos adicionales.
 - Ayuda para comprender qué esperar al principio del tratamiento.
 - Destacar la importancia de hablar con su equipo de atención médica sobre su tratamiento.

* Todos los programas y apoyos están sujetos a requisitos de elegibilidad.

† El personal de enfermería administradores de casos no proporciona asesoramiento médico y no sustituye a su profesional de atención médica y su plan de tratamiento.

Llame o escanee el código ahora
para obtener más información:



1-877-527-9493

1-877-KARY4WD

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este



Pregunte a su equipo de atención médica sobre la inscripción en este programa.

Kit de iniciación del paciente



Una práctica recopilación de herramientas que le permitirán empezar y seguir con la terapia con XPOVIO, incluidos recursos educativos, un libro de recetas para personas con cáncer y otros materiales útiles. El contenido del kit de iniciación del paciente puede cambiar con el tiempo.

Obtenga ayuda para pagar XPOVIO



Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar solo 5 USD por receta de XPOVIO. Escanee el código QR o visite XPOVIO.com/copay-card para aplicar.



Consulte la Información importante de seguridad en todo este documento, así como la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

¿Qué es XPOVIO?

XPOVIO[®] (selinexor) es un medicamento con receta que se utiliza de la siguiente forma:

- En combinación con bortezomib y dexametasona para tratar a pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos una terapia previa.

Se desconoce si XPOVIO es seguro y eficaz en menores de 18 años.

Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre antes de que empiece a tomar XPOVIO y con frecuencia durante los primeros 3 meses de tratamiento y luego según sea necesario durante el tratamiento.

XPOVIO puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Bajos recuentos de plaquetas.** Los bajos recuentos de plaquetas son frecuentes con XPOVIO y pueden ocasionar sangrado, que puede ser grave y, a veces, puede provocar la muerte. Su proveedor de atención médica puede recetarle transfusiones de plaquetas u otros tratamientos para el bajo recuento de plaquetas.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún sangrado o le aparecen fácilmente moretones durante el tratamiento con XPOVIO.

- **Bajos recuentos de glóbulos blancos.** Los bajos recuentos de glóbulos blancos son frecuentes con XPOVIO y, a veces, pueden ser graves. Puede tener mayor riesgo de contraer infecciones bacterianas durante el tratamiento con XPOVIO. Si es necesario, su proveedor de atención médica puede recetarle antibióticos si tiene signos o síntomas de infección.
- **Infecciones graves.** Las infecciones son frecuentes con XPOVIO, pueden ser graves y, a veces, pueden provocar la muerte. Esto incluye infecciones de las vías respiratorias altas o bajas, como la neumonía, y una infección de todo el cuerpo (septicemia). **Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún signo o síntoma de infección, como tos, escalofríos o fiebre, durante el tratamiento con XPOVIO.**
- **Efectos secundarios neurológicos.** XPOVIO puede causar mareos, desmayos, disminución del estado de alerta y cambios en su estado mental, incluidos problemas para pensar, ver u oír cosas que no están realmente ahí (alucinaciones). Estos problemas a veces pueden ser graves y potencialmente mortales. **Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas. No conduzca ni maneje maquinaria pesada o peligrosa hasta que sepa cómo le afecta XPOVIO. Tome precauciones para evitar una caída.**
- **Náuseas y vómitos y/o diarrea.** Pueden producirse náuseas y vómitos o diarrea cuando toma XPOVIO y a veces pueden ser graves. Podría estar en riesgo de deshidratarse. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos contra las náuseas o la diarrea.
- **Pérdida de apetito y pérdida de peso.** La pérdida del apetito y la pérdida de peso son frecuentes con XPOVIO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una disminución o pérdida del apetito y si está perdiendo peso.
- **Disminución de los niveles de sodio en la sangre.** La disminución de los niveles de sodio en sangre es frecuente con XPOVIO. Su proveedor de atención médica puede hablar con usted acerca de su dieta y recetarle líquidos intravenosos o comprimidos de sal.

- **Aparición o empeoramiento de cataratas, visión borrosa o pérdida de transparencia en el cristalino del ojo.** Las cataratas nuevas o que empeoran son frecuentes con XPOVIO. Si se forma una catarata, su visión puede disminuir y es posible que necesite cirugía ocular para eliminar la catarata y restaurar su visión. **Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de cataratas como visión doble, visión borrosa o sensibilidad a la luz o a los destellos.**

Los efectos secundarios frecuentes de XPOVIO incluyen:

- Cansancio.
- Debilidad.
- Bajo recuento de glóbulos rojos (anemia). Los síntomas pueden incluir cansancio y dificultad para respirar.
- Estreñimiento.
- Dificultad para respirar.
- Aumento del azúcar en sangre.
- Cambios en las sales corporales y los niveles de minerales en la sangre.
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática y renal.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XPOVIO.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Antes de tomar XPOVIO, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, lo que incluye si le ocurre algo de lo siguiente:

- Tiene o ha tenido una infección reciente o activa.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. XPOVIO puede causarle daño al bebé en gestación.
- Está tomando medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Capacidad para tener hijos: XPOVIO puede afectar a la capacidad de las mujeres y hombres para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Para las mujeres que pueden quedar embarazadas: su proveedor de atención médica comprobará si está embarazada antes de que empiece a tomar XPOVIO. Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XPOVIO y durante 1 semana después de su última dosis, pues XPOVIO puede causarle daño a un bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o si cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con XPOVIO. No debe amamantar durante el tratamiento con XPOVIO ni durante 1 semana después de su última dosis de XPOVIO. Se desconoce si XPOVIO pasa a la leche materna.

Los hombres con parejas femeninas que puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XPOVIO y durante 1 semana después de su última dosis.

Consulte la **Guía del medicamento y la Información de prescripción completa para XPOVIO.**

Para informar las **SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS**, comuníquese con Karyopharm Therapeutics Inc., al 1-888-209-9326 o con la FDA, al 1-800-FDA-1088, o en www.fda.gov/medwatch.



¿LO SABÍA?

Una organización líder en la práctica clínica oncológica (NCCN®) recomienda tratar el mieloma múltiple con diferentes medicamentos que funcionen de forma distinta después de una recidiva.*

ELIJA UN CAMINO ÚNICO



XPOVIO es un medicamento que se toma por vía oral en el hogar tan solo una vez a la semana, que trata el mieloma múltiple de una forma única y que puede ser un enfoque de tratamiento efectivo ya en su primera recidiva.



XPOVIO funciona de forma diferente a otros tratamientos para el mieloma múltiple para ayudar a restaurar los mecanismos de defensa contra el cáncer de su propio cuerpo.



XPOVIO es para adultos con mieloma múltiple después de haber sufrido una recidiva o de haberse vuelto resistentes a al menos otro tratamiento frecuente, como DARZALEX® (daratumumab).



Los adultos vivieron significativamente más tiempo sin que su enfermedad empeorara

- En un ensayo clínico en el que se estudió a 402 adultos con mieloma múltiple recidivante que habían recibido de 1 a 3 tratamientos previos, 195 pacientes recibieron el régimen de tratamiento con XPOVIO y 207 pacientes recibieron el régimen de tratamiento sin XPOVIO. El ensayo comparó cuánto tiempo vivían los pacientes sin que su enfermedad empeorara.



Hable con su médico sobre XPOVIO hoy mismo; llame al 1-888-209-9326 o visite [XPOVIO.com/mm](https://www.xpovio.com/mm) para obtener más información.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Capacidad para tener hijos: XPOVIO puede afectar a la capacidad de las mujeres y hombres para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.

Consulte la [Guía del medicamento](#) y la [Información de prescripción completa para XPOVIO](#).

Para informar las **SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS**, comuníquese con Karyopharm Therapeutics Inc., al 1-888-209-9326 o con la FDA, al 1-800-FDA-1088, o en www.fda.gov/medwatch.

© 2023 Karyopharm Therapeutics Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.